



XX Olimpiada Iberoamericana de Matemática Universitaria 2017

1. (3 puntos). Sea $n \geq 1$ y sean k_0, \dots, k_{n+1} enteros positivos. Demostrar que existen enteros m_1, \dots, m_n tales que

$$\text{mcd}(k_0, \dots, k_{n+1}) = \text{mcd}(k_0 + m_1 k_1 + \dots + m_n k_n, k_{n+1}).$$

Nota: mcd denota el máximo común divisor.

2. (3 puntos). Sea $S = \{1, 2, 3, \dots, 2017\}$. Un jardinero siembra césped en S de la siguiente forma: cada día el jardinero puede plantar césped en un solo elemento de S cualquiera, además si el número i está cubierto de césped, al día siguiente este césped se habra extendido y cubrirá los números $i - 1$, i , e $i + 1$ (Siempre y cuando los índices correspondientes estén en S). Determinar la menor cantidad de días que necesita el jardinero para lograr cubrir todo S de césped.

3. (4 puntos). Sean P, Q, R puntos alineados en el plano, con Q estrictamente entre P y R , distinto del punto medio de P y R . Sea \mathcal{H} la rama de la hipérbola, con focos P y R , que pasa por Q . Determinar el lugar geométrico de los incentros de los triángulos HPR al variar el punto H sobre $\mathcal{H} - \{Q\}$.

Nota: El incentro de un triángulo es el centro de su círculo inscrito.

4. (5 puntos). Determinar todas las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfacen $f(x)f(y) = f(x + y)$ y $f(x) \geq 1 + x$, para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$.

5. (6 puntos). Sea $\{x_n\}$ una sucesión de números reales acotada. Para $\{x_{n_k}\}$ y $\{x_{m_k}\}$ dos sub-sucesiones, definimos la relación de equivalencia $\{x_{n_k}\} \sim \{x_{m_k}\}$, si $\lim_{k \rightarrow \infty} (x_{n_k} - x_{m_k}) = 0$. Sea \mathcal{C} el conjunto de clases de equivalencias. Probar que $|\mathcal{C}| = 1$ o \mathcal{C} es no numerable.

6. (7 puntos). Sea K un cuerpo finito, $K \neq \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, y considere los conjuntos $A = \{a^2 : a \in K\}$, $B = \{b^4 : b \in K\}$. Demostrar que todo elemento de K se puede escribir como suma de un elemento de A y otro de B .

7. (7 puntos). Sean $a < b < c < d$ números reales tales que

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x-a| \cdot |x-b| \cdot |x-c| \cdot |x-d|}}.$$

Demostrar que

$$\int_a^b f = \int_c^d f.$$